敗醬草（Patriniae Herba）

【來源】本品爲敗醬科（Valerianaceae）植物黃花敗醬 *Patrinia scabiosaefolia* Fisch. 或白花敗醬 *Patrinia villosa* Juss. 之乾燥全草。

【性狀】黃花敗醬：根莖圓柱形，多向一側彎曲，有節，黃綠色至黃棕色；質脆，斷面中部有髓或有小空洞。葉對生，展平後呈羽狀深裂至全裂，裂片邊緣有粗鋸齒；綠色或黃棕色，兩面疏生白毛，葉柄短或盡無柄。

白花敗醬：莖不分枝，有倒生的白色長毛及縱溝紋，斷面中空，莖生葉多不分裂。

【誤用品】

一、菥蓂

【來源】本品爲十字花科（Cruciferae）菥蓂 *Thlaspi arvensis* L. 乾燥帶果之全草。習稱蘇敗醬。

【性狀】根細長圓錐形；表面灰黃色，質脆易折斷，斷面不平坦；莖圓柱形，表面灰黃色或灰綠色，有細縱稜，質脆易折斷，斷面中央有白色疏鬆的髓。葉多脫落。總狀果序生於莖之頂端及葉腋；果實卵圓形而扁平，表面灰黃色或灰綠色，中央略隆起，邊緣有翅，兩面中央各有一縱稜線；果實有縱隔膜分爲兩室，每室有種子 5-7 粒；種子扁圓形，棕黑色。

二、苦蕒菜

【來源】 本品爲菊科（Compositae）植物苦蕒菜 *Sonchus oleraceus* L.乾燥帶花全草。

【性狀】根細長圓錐形，葉展開後呈長圓狀披針形，羽狀分裂，頂裂片大頭狀，邊緣有刺狀尖齒。

三、纈草

【來源】本品爲敗醬科（Valerianaceae）植物纈草 *Valeriana officinalisd* 的乾燥根及根莖。

【性狀】本品呈小段狀。根莖呈鈍圓錐形，棕褐色，上端留有莖基或葉痕，四周生無數不定根。根外表黃棕色至灰棕色，有縱皺紋、易折斷、斷面黃白色、角質，有特異臭氣。

【正品】：白花敗醬藥材

【正品】：黃花敗醬藥材（1）

【正品】：黃花敗醬葉（2）

【誤用品一】：菥蓂藥材（1）

【誤用品一】：菥蓂果實藥材（2）

【誤用品二】：苦蕒菜藥材（1）

【誤用品二】：市售苦蕒菜藥材（2）

【誤用品三】：纈草藥材